

## TBH: Versión para Padre/Cuidador

### EVENTOS TRAUMÁTICOS para niños y adolescentes entre 0-18 años

(Adaptado de la Lista de Trastorno de Estrés Postraumático para Niños, © Michael Scheeringa, MD, MPH, 2010, Tulane University, New Orleans, LA. Traducción al español hecha por Mora Violeta Puértolas López, 2014.)

**TIPS # del joven** \_\_\_\_\_ **Edad:** \_\_\_\_ años **Fecha:** \_\_\_\_\_

**Sobre Niños/Adolescentes Entre 0 -18 Años:**

Persona llenando este formulario: 1 – Padre    2 – Pariente    3 – Padre adoptivo    4 - Otro

PARA INCLUIR UN EVENTO, SU HIJO/HIJA DEBE HABER SENTIDO UNO DE ESTOS:

(1) SENTIR QUE EL O ELLA MORIRÁ

(2) QUE EL O ELLA ESTABA HERIDO(A) O QUE SE PODRÍA HACER DAÑO, O

(3) EL/ELLA VIÓ (1) O (2) QUE LE PASO A OTRA PERSONA, O VIÓ A ALGUIEN MORIR.

	<b>0 = No le ocurrió a mi hijo/hija.</b> <b>1 = Sí le ocurrió a mi hijo/hija</b>	Marque la <u>edad</u> de su hijo/hija la <u>primera</u> vez que esto ocurrió.	Marque la <u>edad</u> de su hijo/hija la <u>última</u> vez que esto ocurrió.	Marque <u>cuantas veces</u> esto le ocurrió a su hijo/hija.
1. Accidente o choque en un automovil, avión o bote.	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 ≥10
2. Atacado(a) por un animal.	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 ≥10
3. Desastres (inundación, huracán, tornado, incendio, guerra, etc.).	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 ≥10
4. Hospitalización o tratamiento médico invasivo.	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 ≥10
5. Abuso físico.	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 ≥10
6. Abuso sexual, asalto sexual, o violación.	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 ≥10

7. Accidentes que amenazan la vida (quemaduras, caídas, ahogamiento, etc.).	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 $\geq 10$
8. Vió a <u>otra persona</u> ser golpeada, violada, amenazada con daño serio, disparada, herida seriamente, o asesinada.	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 $\geq 10$
9. Otro:	0 1 No estoy seguro(a)	0-6 7-12 13-18	0-6 7-12 13-18	1 2-5 6-9 $\geq 10$
10. Si más de un evento le ocurrió a su hijo(a): anote el número del evento que le causó la mayor cantidad de angustia:				

**CONTINUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.....**

Este formulario puede ser reproducido y usado gratuitamente, pero no vendido, sin el permiso del autor.

## **SOLO Para Niños/Adolescentes Entre 3-18 Años:**

Abajo hay una lista de problemas que niños pueden tener después de vivir uno de los eventos en la página anterior. Lea cada uno cuidadosamente y marque el número (0-3) que mejor describe con qué frecuencia su hijo/hija ha tenido ese problema EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS. Llene esto aunque no haya marcado ninguno de los eventos en la página anterior; especialmente para niños en cuidado adoptivo, llenar este formulario puede darle mayor conocimiento sobre eventos acerca de los que todavía no sabe.

	0	1	2	3
	Nunca o solo una vez	Una vez a la semana o menos/de vez en cuando	De 2 a 4 veces a la semana/la mitad del tiempo	5 o más veces a la semana/casi siempre
11. Tiene pensamientos o imágenes molestosas sobre el evento que aparecieron en la mente del niño(a) cuando el/ella no quería pensar en eso	0	1	2	3
12. Tiene malos sueños o pesadillas	0	1	2	3
13. Actúa o siente como si el evento estuviera ocurriendo de nuevo (oye algo o ve una foto y siente como si el/ella está ahí de nuevo)	0	1	2	3
14. Se siente triste cuando piensa o oye algo del evento (por ejemplo, se siente asustado(a), enojado(a), triste, culpable, etc.)	0	1	2	3
15. Siente algo en su cuerpo cuando piensa o oye algo sobre el evento (por ejemplo, empieza a transpirar, el corazón le late más rápido)	0	1	2	3
16. Trata de no pensar, hablar, o tener sentimientos sobre el evento	0	1	2	3
17. Trata de evitar actividades, gente, o lugares que le recuerdan del evento traumático	0	1	2	3
18. Está mucho menos interesado(a) en hacer cosas que antes le gustaban	0	1	2	3
19. No se siente cerca de las personas a su alrededor	0	1	2	3
20. No puede tener sentimientos fuertes (por ejemplo, no puede llorar o sentirse feliz)	0	1	2	3
21. Siente que sus planes o sueños para el futuro no se realizarán (por ejemplo, el/ella no trabajará o no se casará o no tendrá hijos)	0	1	2	3
22. Tiene dificultad durmiendo o quedándose dormido	0	1	2	3
23. Se siente irritable o tiene ataques de rabia	0	1	2	3

24. Es demasiado cuidadoso(a) (por ejemplo, chequea para ver que o quién está a su alrededor) 0 1 2 3

25. Es asustadizo o se sobresalta fácilmente (por ejemplo, cuando alguien se le acerca por atrás) 0 1 2 3

---

**CONTINUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.....**

(Las preguntas 11-25 son de la Escala de Síntomas de PTSD en Niños (CPSS), Version para Cuidador [Foa et al., 2001])

### **SOLO Para Niños/Adolescentes Entre 3-18 Años:**

Por favor marque el número bajo el encabezamiento que mejor describe a su hijo(a):

	(0) NUNCA	(1) A VECES	(2) MUCHAS VECES
26. Se siente triste o infeliz	0	1	2
27. Se siente desesperanzado(a)	0	1	2
28. Se siente bajoneado(a)	0	1	2
29. Se preocupa mucho	0	1	2
30. Parece divertirse menos	0	1	2
31. Es inquieto(a)	0	1	2
32. Pasa mucho tiempo soñando despierto(a)	0	1	2
33. Se distrae fácilmente	0	1	2
34. Le cuesta concentrarse	0	1	2
35. Actúa como si conducido por un motor	0	1	2
36. Se pelea con otros niños	0	1	2
37. No hace caso a las reglas	0	1	2
38. No entiende los sentimientos de otros	0	1	2
39. Se burla de otros	0	1	2
40. Culpa a otros por sus problemas	0	1	2
41. Se niega a compartir	0	1	2
42. Se lleva cosas que no le pertenecen	0	1	2
43. Se preocupa de si las cosas le saldrán bien	0	1	2
44. Siente que no es igual de bueno(a) que otros niños	0	1	2
45. Tiene miedo de quedarse solo(a) en casa	0	1	2

(Las preguntas 26-42 son de la Lista de Síntomas Pediátrica [Murphy et al., 1989])

(Las preguntas 43-45 son de la lista SCARED [Birmaher et al., 1999])

	No o No Sabe	Sí
46. ¿Ha sido el niño/adolescente un peligro a si mismo o a otros en los últimos 90 días (atentó suicidio; expresó ideas de suicidio; se puso en situaciones peligrosas; asaltó a otras personas; intentó de asaltar o asaltó a otros niños sexualmente, etc.)?	0	1
47. ¿Ha demostrado comportamientos raros o inusuales? (Masturbación excesiva o pública; parece oír voces; se golpea la cabeza; unta feces, incendia cosas, lastima animales, etc.)	0	1

**SOLO Para Adolescentes Entre 13-18 Años:**

	No o No Sabe	Sí
48. ¿Se sabe que el niño/adolescente abusa alcohol y/o drogas?	0	1

**Para Niños Entre 1-18 Años:**

49. ¿ Tiene el niño/adolescente problemas con mantenimiento personal? (Come o toma cosas que no son alimento; come demasiado o muy rápidamente; esconde comida; para niños de 6 años o más – no sabe usar el baño).	0	1
50. ¿Tiene el niño(a) un retraso con el language?	0	1
51. ¿Se mece o aletéa los brazos?	0	1

**SOLO Para Niños Entre 1-6 Años:**

52. ¿Demuestra el niño(a) cariño indiscriminado (por ejemplo, se acerca a un desconocido para darle un abrazo)?	0	1
53. ¿Tiene el niño(a) berrinches frecuentes y intensos o comportamiento extremadamente agresivo?	0	1
54. ¿No le pide el niño(a) consuelo a nadie – o solo a un hermano(a)?	0	1
55. ¿Tiene un problema con el sueño, dificultad durmiendose, o patatea en la noche?	0	1
56. ¿Es retraído, sentado y mirando a la distancia con una expresión ausente?	0	1

(Las preguntas 46-56 son del Formulario de Investigación de Salud Conductual [DCFS])

**Gracias.**