

YOUNG CHILD PTSD SCREEN (YCPS)

Nombre _____ ID _____ Fecha _____

EVENTOS TRAUMATICOS

Un evento debe haber dado lugar a lesiones graves o ser percibida como si se podría haber dado lugar a una lesión grave al niño, o para otra persona (por lo general un ser querido) y el niño fue testigo de él, y es generalmente repentino y / o inesperado.

0 = Ausente 1 = Presente

Círculo 0 si el evento no ha ocurrido y 1 si el evento ha sucedido a su hijo.

Frecuencia es el número de eventos que el niño puede recordar. Generalmente, los niños comienzan a recordar eventos alrededor de los 3 años de edad.

			<u>Frecuencia</u>
P1. Accidente o choque se un automóvil, avión o barco	0	1	_____
P2. Atacado por un animal	0	1	_____
P3. Desastres provocados por el hombre (incendios, guerras, etc.)	0	1	_____
P4. Desastres naturales (huracanes, tornados, inundaciones)	0	1	_____
P5. Hospitalización médica o procedimientos médicos invasivos	0	1	_____
P6. Abuso físico	0	1	_____
P7. Abuso sexual, agresión sexual o violación	0	1	_____
P8. Quemadura accidental	0	1	_____
P9. A punto de haberse ahogado	0	1	_____
P10. Fue testigo de que golpearan a otra persona, violada, amenazado con ser dañado gravemente, de que le hayan disparado gravemente, herido o que lo hayan metado	0	1	_____
P11. Secuestrado	0	1	_____
P12. Otros: _____	0	1	_____

Abajo hay una lista de síntomas que los niños pueden tener después de acontecimientos que amenazan la vida.

Pensando en TODOS los acontecimientos traumáticos que amenazan la vida en la primera página, circule el número abajo (0-2) que mejor describa con qué frecuencia el síntoma se ha presentado en las 2 semanas pasadas.

	0	1	2
	No	Un poco	Mucho
1. ¿Tiene su niño/niña recuerdos obsesivos involuntarios del evento traumático? ¿Los expresa por cuenta propia?	0	1	2
2. ¿Está teniendo el niño más pesadillas desde que el evento traumático ocurrió?	0	1	2
3. ¿Se molesta cuando algo le recuerda el evento o eventos traumáticos?	0	1	2
<p>Por ejemplo, un niño que ha estado en un accidente automovilístico podría ponerse nervioso al viajar en coche.</p> <p>O un niño que ha estado en un huracán podría ponerse nervioso cuando llueve.</p> <p>O un niño que ha presenciado violencia doméstica podría ponerse nervioso cuando otras personas discuten. O una niña que sufrió abuso sexual podría ponerse nerviosa cuando alguien la toca.</p>			
4. ¿Le ha sido más difícil al niño dormir o permanecer dormindo después del evento traumático?	0	1	2
5. Desde el evento o eventos traumáticos, ¿el niño ha estado más irritable, ha tenido arrebatos de ira o ha desarrollado rabietas extremas?	0	1	2
6. ¿Se asusta más fácilmente su niño que antes del evento o eventos traumáticos? Por ejemplo, si hay un ruido fuerte o alguien aparece de repente por detrás, ¿se sobresalta o asusta?	0	1	2

TANTEO

Dos síntomas aprobados (1 o 2) se consideran una prueba positiva y deben ser referidos para tratamiento. Un niño con un solo síntoma respaldado es marginalmente positivo y debe ser referido para más pruebas al mínimo.

© Michael Scheeringa, MD, MPH, 2010, Tulane University, New Orleans, Louisiana.
mscheer@tulane.edu. Este formulario puede reproducirse y usarse de forma gratuita, pero no venderse, sin el permiso del autor.